

inflamación del reservorio ileal (“pouchitis”)

¿Esta complicación les pasa a todos?

No, esto no le pasa a todos. Aproximadamente 25% de los pacientes lo pueden desarrollar después de 1 año, 35% a los 3 años y 45% después de 5 años.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas incluyen un incremento en el número de heces por día, urgencia, sangre en las heces y dolor abdominal.

¿Como se trata?

Aunque algunas veces no requiere tratamiento, en la mayoría de los casos estos síntomas se resuelven con antibióticos. En casos recurrentes podemos usar otros medicamentos.

¿Puede ocurrir más de una vez?

Si. El 60% de los pacientes pueden tener una recurrencia, y 20% pueden tener síntomas persistentes.

inflamación del manguito (o muñón) rectal (“cuffitis”)


El reservorio rectal se une al ano por medio de una sección pequeña del recto. Este pedacito de recto se conoce como el manguito o muñón rectal (“rectal cuff”). Si este tejido se inflama puede causar síntomas. En ingles esta inflamación se llama “cuffitis.”

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas son parecidos a los de “pouchitis”

¿Como se trata?

Se trata con supositorios, enemas, o medicamentos usados para tratar la colitis ulcerativa.



Cirugía para Colitis Ulcerativa

Cirugía Pediátrica

1825 4th street
San Francisco, CA 94158
(415) 476-2538

747 52nd street
Oakland, CA 94609
(510) 428-3022

Gastroenterología Pediátrica

1825 4th street
San Francisco, CA 94158
(415) 476-5892


744 52nd street
Oakland, CA 94609
(510) 428-3058



UCSFBENIOFFCHILDRENS.ORG/IBD

primera etapa


resección del intestino grueso o colon



por lo menos 2 meses

segunda etapa

resección del recto y creación del reservorio ileal ("pouch")



2 meses

tercera etapa


cierre de ileostomía



¿qué esperar después de la cirugía?

Hospitalización: 5-10 días


Dieta baja en fibra por 2 semanas seguida por una reintroducción lenta de fibra



¿qué esperar después de la cirugía?

Hospitalización: 4-5 días

Dieta baja en fibra por 2 semanas seguida por una reintroducción lenta de fibra



¿qué esperar después de la cirugía?

Hospitalización: 4-5 días

Dieta normal

Restricciones: No cargar objetos pesados (no más que 10lb o un galón de leche) por 4 semanas después de la cirugía

cicatriz de la ileostomía

seguimiento

Por lo menos una vez al año necesitará ver a su médico, obtener pruebas de sangre, y posiblemente una colonoscopia

